

# Paciente entre 18 y 70 años

## FACTORES DE RIESGO

- Diabetes
- Hipertensión arterial
- Antecedente de infarto agudo de miocardio, accidente cerebro-vascular o arteriopatía periférica
- Hábito tabáquico
- Consumo crónico de drogas potencialmente nefrotóxicas o exposición a metales pesados
- Antecedente de patologías obstructivas urológicas o ginecológicas
- Antecedente familiar de enfermedad renal
- Antecedente de enfermedades sistémicas que pueden afectar al riñón como LES
- Proteinuria
- Hematuria aislada luego de descartar una causa urológica
- **Antecedentes de enfermedad renal\***

SI

NO

No Registro

NO

## ¿DAÑO RENAL?

- Proteinuria persistente
- Alteraciones del sedimento urinario:
  - Microhematuria persistente
  - Presencia persistente de leucocitos
  - Presencia de cilindros eritrocitarios
  - Presencia de cilindros leucocitarios
- Resultados anormales de estudios por imágenes (ecografía), por ej.:
  - Cicatrices renales
  - Riñones pequeños
- Quistes renales múltiples y bilaterales
- Biopsia renal patológica

SI

Filtrado Glomerular

> 60 ml/min

< 60 ml/min

Registro

SI

NO

No Registro

## \* Antecedentes de enfermedad renal:

- Glomerulonefritis
- Síndrome Urémico Hemolítico
- Mieloma
- Nefroangioesclerosis
- Poliquistosis renal
- Amiloidosis
- Nefropatía familiar
- Nefropatía Diabética
- Nefritis túbulo-intersticial
- Nefropatía obstructiva
- Nefropatía Lúpica
- Nefropatía crónica del trasplante
- Desconocida
- Otra